

**Prospecto: información para el usuario**

# **Almax 1 g/7,5 ml Suspensión oral**

Almagato

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico, farmacéutico o enfermero.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte con su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 14 días.

**Contenido del prospecto:**

1. Qué es Almax y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Almax
3. Cómo tomar Almax
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Almax
6. Contenido del envase e información adicional

## **1. Qué es Almax y para qué se utiliza**

Almax pertenece a un grupo de medicamentos denominados antiácidos, que son compuestos que actúan neutralizando el exceso de ácido del estómago.

Está indicado en el alivio y tratamiento sintomático de la acidez y ardor de estómago en adultos y mayores de 12 años.

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 14 días.

## **2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Almax**

**No tome Almax**

- Si es alérgico al almagato o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- Si padece enfermedad de Alzheimer.
- Si presenta hemorragia no diagnosticada del aparato digestivo, hemorroides, retención de líquidos (edema), complicación del hígado durante el embarazo (toxemia gravídica) o diarrea.

**Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a tomar Almax:

- Si tiene alguna enfermedad del riñón leve o moderada ya que los iones aluminio y magnesio se pueden acumular a largo plazo en el organismo. En este caso es posible que le recomiendan dosis más bajas. Almax no se recomienda en insuficiencia renal grave.
- Si sigue una dieta baja en fósforo, presenta diarrea, malabsorción o está muy debilitado, ya que las sales de aluminio disminuyen la absorción de fósforo, lo que puede provocar, sobre todo con tratamientos prolongados, una disminución del contenido de fosfatos en sangre (pérdida de apetito, debilidad muscular, malestar general, etc.) y una mineralización insuficiente de los huesos (osteomalacia).
- Si es un paciente de edad avanzada ya que el uso continuado de antiácidos que contienen aluminio puede agravar alguna enfermedad existente de huesos (osteoporosis y osteomalacia), debido a la reducción de fósforo y calcio.

Informe a su médico si presenta cualquier síntoma que indique hemorragia del aparato digestivo, como vómitos de sangre o coloración negruzca de las heces.

**Niños y adolescentes**

No se debe administrar antiácidos a niños menores de 12 años, ya que pueden ocultarse otras enfermedades ya existentes (por ejemplo apendicitis). En los más pequeños existe el riesgo de un aumento del magnesio en sangre o toxicidad por aluminio, sobre todo si están deshidratados o tienen alguna enfermedad del riñón.

**Uso de otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico que está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Los antiácidos modifican la absorción de numerosos medicamentos por lo que, de manera general, la ingestión de Almax debe distanciarse (2-3 horas) de la administración de cualquier otro medicamento.

Es especialmente importante que informe a su médico si toma alguno de los siguientes medicamentos:

- Antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos utilizados para tratar el dolor y la inflamación, ej. ácido flufenámico o mefenámico, indometacina)
- Antiulcerosos (medicamentos para tratar la úlcera de estómago o de duodeno y la acidez de estómago entre otras, ej. cimetidina, famotidina, ranitidina)
- Digitalicos (medicamentos para tratar alteraciones en el funcionamiento del corazón, ej. digoxina, digitoxina)
- Antipsicóticos (medicamentos para tratar desórdenes de la conducta y síntomas psiquiátricos, ej. clorpromazina)
- Lansoprazol (medicamento para tratar la úlcera de estómago)
- Corticoides (prednisona)
- Gabapentina (medicamento para tratar la epilepsia)
- Ketoconazol (medicamento para tratar los hongos)
- Medicamentos para el tratamiento de las infecciones, como penicilamina, quinolonas (ciprofloxacino), tetraciclinas (clortetraciclina, demeclociclina, doxiciclina)
- Sales de hierro (sulfato de hierro)

ya que Almax puede disminuir la absorción de los medicamentos anteriormente listados por cambios en las condiciones del estómago o por la formación de complejos poco solubles.

- Quinidina (medicamento para tratar las alteraciones del ritmo del corazón), ya que Almax puede potenciar su toxicidad al disminuir su eliminación debido al aumento del pH de la orina.
- Salicilatos (medicamentos para aliviar el dolor y reducir la fiebre y la inflamación, ej. ácido acetilsalicílico), ya que Almax puede disminuir sus concentraciones por una mayor eliminación debida al aumento del pH de la orina, especialmente con altas dosis de salicilato.

Consulte a su médico en caso de que le vayan a hacer un análisis de la composición del estómago, ya que Almax puede alterar el resultado del análisis.

**Embarazo, lactancia y fertilidad**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

**Embarazo**

Se debe evitar el uso crónico o excesivo de Almax durante el embarazo debido al riesgo de aparición de alteraciones en el feto/recién nacido. En caso de necesitar un tratamiento más prolongado, consulte a su médico que le indicará la pauta adecuada.

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

#### **Lactancia**

Se debe evitar el uso crónico o excesivo de Almax.

Aunque se pueden eliminar pequeñas cantidades de aluminio y magnesio por la leche materna en madres tratadas con Almax, su concentración no es lo suficientemente elevada como para producir efectos adversos en el lactante.

#### **Conducción y uso de máquinas**

Almax no afecta a su capacidad para conducir o manejar maquinaria.

#### **Almax 1 g/7,5 ml Suspensión oral contiene sorbitol**

Este medicamento contiene sorbitol. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

### **3. Cómo tomar Almax**

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico, farmacéutico o enfermero. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico o enfermero.

**Uso en adultos y mayores de 12 años:** La dosis recomendada es de una dosis de 7,5 ml (1 gramo de almagato), tres veces al día, preferentemente de media a una hora después de las comidas. Si se presentan nuevamente molestias se puede tomar otra dosis antes de acostarse. No se deben exceder los 8 gramos al día (8 dosis de 7,5 ml).

**Uso en pacientes de edad avanzada:** No es preciso modificar la dosis (Ver apartado "Advertencias y precauciones").

**Uso en pacientes con alguna enfermedad del riñón:** Si padece insuficiencia renal grave no se recomienda tomar Almax (Ver apartado "Advertencias y precauciones").

Si padece alguna enfermedad del riñón leve o moderada, es posible que su médico le recomiende dosis más bajas (Ver apartado "Advertencias y precauciones").

Almax debe tomarse por vía oral.

Conviene agitar enérgicamente el frasco de la suspensión antes de extraer la dosis y utilizar el vaso dosificador que se acompaña. La suspensión oral se puede tomar directamente con el vaso dosificador o se puede verter el contenido en medio vaso de agua, remover y tomar seguidamente.

#### **Si toma más Almax del que debe**

A las dosis recomendadas no cabe esperar una intoxicación con este medicamento. En pacientes con una dieta baja en fósforo y/o en tratamientos prolongados con dosis altas, puede aparecer una disminución del contenido de fosfatos en sangre y una mineralización insuficiente de los huesos.

Si ha tomado más Almax del que debiera, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico, o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420, indicando el medicamento y la cantidad tomada.

#### **Si olvidó tomar Almax**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Tome la dosis olvidada cuando pueda si el intervalo de tiempo transcurrido es pequeño, o espere a tomar la siguiente dosis siempre que no existan molestias, en cuyo caso puede tomarse antes. Tome las siguientes dosis con la separación indicada entre tomas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero.

### **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, Almax puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Debido a la escasa absorción intestinal, los efectos adversos de almagato son poco frecuentes. En ocasiones (no se dispone de datos que estimen la frecuencia), se han descrito diarreas que, generalmente, desaparecen tras la suspensión del tratamiento.

#### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano, Website: [www.notificaram.es](http://www.notificaram.es). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

### **5. Conservación de Almax**

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No requiere condiciones especiales de conservación.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda, pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

### **6. Contenido del envase e información adicional**

#### **Composición de Almax 1 g/7,5 ml suspensión oral:**

- El principio activo es almagato. Cada 7,5 ml de suspensión oral contienen 1 gramo de almagato
- Los demás componentes son celulosa microcristalina (E-460), carmelosa de sodio, sacarina de calcio (E-954), diacetato de clorhexidina, esencia de menta, solución de sorbitol (E-420) al 70% no cristalizable, emulsión de simeticona y agua purificada.

#### **Aspecto del producto y contenido del envase**

Almax es un líquido de color blanco-amarillento, con olor y sabor a menta. Se presenta en frascos de vidrio que contienen 225 ml de suspensión.

#### **Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación**

#### **Titular de la autorización de comercialización**

Almirall, S.A.  
General Mitre, nº 151  
08022 – Barcelona (España).

#### **Responsable de la fabricación**

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A.  
Ctra. Nacional II, Km. 593  
08740 Sant Andreu de la Barca – Barcelona (España).

#### **Este prospecto ha sido aprobado en julio de 2013**

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>

**Package leaflet: Information for the user**

# **Almax 1 g/7.5 ml Oral suspension**

**Almagate**

**Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.**  
Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor, pharmacist or nurse has told you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Ask your pharmacist if you need more information or advice.
- If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.
- You must talk to a doctor if you do not feel better or if you feel worse after 14 days.

**What is in this leaflet:**

1. What Almax is and what it is used for
2. What you need to know before you take Almax
3. How to take Almax
4. Possible side effects
5. How to store Almax
6. Contents of the pack and other information

## **1. What Almax is and what it is used for**

Almax belongs to a group of medicinal products called antacids, compounds that act by exercising a neutralising action on excess stomach acid.

It is indicated in the relief and symptomatic treatment of acidity and heartburn in adults and over 12 years old.

You must talk to a doctor if you do not feel better or if you feel worse after 14 days.

## **2. What you need to know before you take Almax**

**Do not take Almax**

- If you are allergic to almagate or to any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6)
- If you have Alzheimer's disease.
- If you have undiagnosed haemorrhage of the digestive system, haemorrhoids, fluid retention (oedema), liver complication during pregnancy (toxemia of pregnancy) or diarrhoea.

**Warnings and precautions**

Talk to your doctor, pharmacist or nurse before taking Almax.

- If you have a mild or moderate kidney disease, since the aluminium and magnesium ions may accumulate in the long term in the organism. In this case, they may recommend lower doses for you. Almax is not recommended in severe renal impairment.
- If you are on a low-phosphorous diet, if you have diarrhoea, malabsorption or are very weak, since aluminium salts reduce the absorption of phosphorous, which may cause, particularly with prolonged treatments, a reduction in the content of phosphates in blood (loss of appetite, muscle weakness, general discomfort, etc.) and insufficient bone mineralisation (osteomalacia).
- If you are an elderly patient, since the continuous use of aluminium-containing antacids may aggravate existing bone disease (osteoporosis and osteomalacia), due to the reduction of phosphorous and calcium.

Inform your doctor if you have any symptom that indicates digestive system haemorrhage, such as vomiting blood or blackish stools.

**Children and adolescents**

Antacids should not be given to children under the age of 12 years, since other existing diseases may be masked (for example appendicitis).

In younger children, there is a risk of increased magnesium in blood or aluminium toxicity, particularly if they are dehydrated or have any kidney disease.

**Other medicines and Almax**

Tell your doctor or pharmacist if you are using, have recently used or might use any other medicines.

The antacids modify the absorption of numerous medicines whereby, generally speaking, time should be allowed to elapse (2-3 hours) between Almax and the taking of any other medicine.

It is particularly important that you inform your doctor if you are taking any of the following medicines:

- Non-steroidal anti-inflammatories (medicines used to treat pain and inflammation, such as flufenamic or mefenamic acid, indomethacin)
- Anti-ulcer drugs (medicines for treating stomach or duodenal ulcer and sour stomach, among others, e.g. cimetidine, famotidine, ranitidine)
- Digitalis (medicines used to treat heart disorders, such as digoxin, digitoxin)
- Antipsychotics (medicines for treating behavioural disorders and psychiatric symptoms, for example, chlorpromazine)
- Lansoprazole (medicine for treating stomach ulcer)
- Corticosteroids (prednisone)
- Gabapentin (medicine for treating epilepsy)
- Ketoconazole (medicine for treating fungi)
- Medicines for treating infections, such as penicillamine, quinolones (ciprofloxacin), tetracyclines (chlortetracycline, demeclocycline, doxycycline)
- Iron salts (iron sulphate)

since Almax may reduce the absorption of these medicines through changes in the conditions of the stomach or through the formation of slightly soluble complexes.

- Quinidine (medicine for treating heart rate alterations), since Almax may boost its toxicity through the reduction of its elimination due to increased pH in urine.
- Salicylates (medicines for relieving pain and reducing fever and inflammation, such as acetylsalicylic acid), since Almax may reduce their concentrations through greater elimination due to an increase of urine pH, particularly with high doses of salicylate.

See your doctor if you are to have a stomach composition analysis, since Almax may alter the results of the analysis.

**Pregnancy, breast-feeding and fertility**

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

**Pregnancy**

The chronic or excessive use of Almax should be avoided during pregnancy due to the risk of alterations in the foetus/newborn. If you need a more prolonged treatment have your doctor give you a suitable regimen.

If you are pregnant or think that you might be, see your doctor or pharmacist before taking any medicine. The use of medicines during pregnancy could be dangerous for the embryo or foetus and should be monitored by your doctor.

**Breast-feeding**

Chronic or over-use of Almax should be avoided. Although small amounts of aluminium and magnesium may be eliminated in the milk of mothers treated with Almax, their concentration is not high enough to produce adverse effects in the breastfed infant.

## **Driving and using machines**

Almax does not affect the ability to drive and use machines.

## **Almax 1 g/7.5 ml oral suspension contains sorbitol**

This medicine contains sorbitol. If your doctor has told you that you suffer from intolerance to certain sugars, ask him before using this medicine.

## **3. How to take Almax**

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor, pharmacist or nurse have told you. Check with your doctor, pharmacist or nurse if you are not sure.

**Use in adults and children over 12 years of age:** The recommended dose is a dose of 7.5 ml (1 g of almagate), three times a day, preferably half an hour or one hour after meals. If the discomfort reappears, you may take another dose before going to bed.

Do not exceed 8 grams a day (8 doses of 7.5 ml).

**Use in elderly patients:** There is no need to modify the dose (see "Warnings and precautions" section).

**Use in patients with a kidney disease:** You should not take Almax if you have severe renal impairment (see "Warnings and precautions" section).

If you have mild or moderate kidney disease, your doctor may recommend lower doses (see "Warnings and precautions" section).

Almax should be taken orally.

Shake the bottle of suspension vigorously before extracting the dose and use the dosage cup provided. The oral suspension should be taken directly with the dosage cup, or the contents may be poured into half a glass of water, stir and take immediately.

## **If you take more Almax than you should**

No toxicity should be expected with this medicine at the recommended doses. In patients on a low phosphorous diet and/or in prolonged treatments with high doses, there may be a reduction in the content of phosphates in blood, and insufficient bone mineralisation.

If you take more Almax than you should, see your doctor or pharmacist immediately or call the Toxicology Information Service, telephone number 915 620 420, indicating the medicinal product and the amount taken.

## **If you forget to take Almax**

Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. Take the dose you forgot if not much time has passed, or wait until the next dose as long as you feel no discomfort, in which case you may take the dose earlier. Take the following doses with the indicated separation between takes.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor, pharmacist or nurse.

## **4. Possible side effects**

Like all medicines, Almax can cause side effects, although not everybody gets them.

Due to the scant intestinal absorption, the side effects of almagate are uncommon. On occasions (there are no data that estimate frequency), diarrhoeas have been described, although generally they remitted following withdrawal of the treatment.

## **Reporting of side effects**

If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report side effects directly via the Spanish System of Pharmacovigilance of Human Medicines, website: [www.notificaram.es](http://www.notificaram.es). By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

## **5. How to store Almax**

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

No special precautions for storage.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the container, after CAD. The expiry date refers to the last day of that month.

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Place packagings and the medicines that you do not need in the SIGRE Point  of the pharmacy. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

## **6. Contents of the pack and other information**

### **Composition of Almax 1 g/7.5 ml oral suspension:**

- The active substance is almagate. 7.5 ml of oral suspension contain 1 g of almagate.
- The other ingredients are microcrystalline cellulose (E-460), carmellose sodium, calcium saccharin (E-954), chlorhexidine diacetate, mint essence, non-crystallisable solution of 70% sorbitol (E-420), simethicone emulsion and purified water.

### **What the product looks like and contents of the pack**

Almax is a white-yellowish liquid with mint smell and taste. It is packaged in glass bottles containing 225 ml of suspension.

## **Marketing authorisation holder and manufacturer**

### **Marketing authorisation holder**

Almirall, S.A.  
General Mitre, nº 151  
08022 – Barcelona (Spain).

### **Manufacturer**

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A.  
Ctra. Nacional II, Km. 593  
08740 Sant Andreu de la Barca - Barcelona (España).

## **This leaflet was last revised in July 2013**

Detailed and updated information on this medicine is available on the website of Spanish Agency of Medicines and Medical devices (AEMPS) [www.aemps.gob.es](http://www.aemps.gob.es)